

1,60 à 1,90 m
0,62 à 0,67 m
1,2 à 2,3 kg



Adulte

CIRCAËTE JEAN-LE-BLANC



Répartition

Eteint Menacé Préoccupation mineure
EX EW CR EN VU NT **LC**

Statut de conservation en France (UICN) : **Préoccupation mineure**

CIRCAETUS GALLICUS FAMILLE DES ACCIPITRIDÉS

Ce grand rapace au-dessous très clair revient à la mi-mars de ses terres d'hivernage africaines. Il installe son nid dans les secteurs boisés avec des zones ouvertes riches en reptiles. Ces derniers constituent l'essentiel de sa nourriture bien qu'il ne soit pas immunisé contre le venin des vipères. Avec sa maîtrise des moindres flux aériens, le Circaète est un spécialiste du vol sur place pour le repérage de ses proies, dont le mouvement va déclencher son attaque. La population française est estimée entre 2 400 et 2 900 couples.

Migrateur

1,45 à 1,74 m
0,55 à 0,60 m
1,2 à 2 kg



Adulte

BALBUZARD PÊCHEUR



Répartition

Eteint Menacé Préoccupation mineure
EX EW CR EN **VU** NT LC

Statut de conservation en France (UICN) : **Vulnérable**

PANDION HALIAETUS FAMILLE DES PANDIONIDÉS

Le Balbuzard est spécifiquement adapté à la pêche et vit donc dans les forêts à proximité d'étangs ou en ripisylve des grands cours d'eau, sauf en Corse où il fréquente les côtes rocheuses sauvages. Il se nourrit de poissons vivants repérés en vol et capturés au terme d'un plongeon spectaculaire et bruyant. Son nid volumineux est construit à la cime d'un arbre, souvent un Pin sylvestre, ou sur un piton rocheux en bord de mer. En France continentale, les oiseaux sont de grands migrateurs vers l'Afrique alors que ceux de Corse ne le sont que partiellement. La population est estimée à une centaine de couples.

Migrateur

2 à 2,45 m
0,70 à 0,90 m
3 à 6,9 kg



Adulte

PYGARGUE A QUEUE BLANCHE



Répartition

Eteint Menacé Préoccupation mineure
EX EW **CR** EN VU NT LC

Statut de conservation en France (UICN) : **En danger critique d'extinction**

HALIAETUS ALBICILLA FAMILLE DES ACCIPITRIDÉS

L'un des plus grands rapaces d'Europe. Naguère seulement hivernant strict en France après sa disparition de Corse, il y a un demi-siècle, il niche depuis 2011 dans le Grand Est, et est présent dans le Centre. Il fréquente les grandes zones humides tranquilles et riches en nourriture. Il se nourrit de poissons, d'oiseaux et volontiers aussi de cadavres divers. Silencieux la plupart du temps, il émet lors des parades des séries de cris aboyés. 3 à 4 couples sont connus en France.

Ce dépliant présente les Aigles vrais (genre Aquila), caractérisés notamment par des tarses emplumés jusqu'aux doigts, plus trois autres espèces de grande taille, communément assimilées aux aigles. Comme chez la plupart des rapaces, la femelle, en charge de la défense rapprochée du nid, est plus grande et plus forte que le mâle. Cette différence de taille permet en outre l'exploitation de catégories de proies de tailles différentes et ainsi une utilisation optimale des ressources alimentaires sur les territoires. Ces 7 espèces ont en commun d'être rares voire très rares, avec des populations dans un état de conservation généralement préoccupant face à des menaces croissantes comme la fragmentation de leurs habitats par divers « aménagements » du territoire.

IL Y A 7 ESPÈCES D'AIGLES NICHEURS EN FRANCE



Aigle botté
Quasi menacé

Aigle de Bonelli
En danger

Circaète Jean-le-Blanc
Préoccupation mineure

Pygargue à queue blanche
Danger critique d'extinction

Aigle royal
Vulnérable

Balbuzard pêcheur
Vulnérable

Aigle Pomarin
Espèce non soumise à l'évaluation

AUTRES RAPACES

Vautour moine
En danger critique



Buse variable
Espèce commune



Milan royal
Vulnérable



Faucon crécerelle
Espèce commune



Faucon pèlerin
Espèce commune

LPO

Parc Montsouris,
26 boulevard Jourdan,
75014 Paris

Conception : Stella de Hemptinne
Illustrations : François Desbordes
Maquette et composition :
Emmanuel Caillet, studio La Tomate Bleue
Impression : IDHP



A VOS JUMELLES

1,25 à 1,9 m
0,8 à 0,95 m
2,9 à 6,6 kg

Adulte



AIGLE ROYAL

AQUILA CHRYSAETOS
FAMILLE DES ACCIPITRIDÉS

Espèce sédentaire nichant dans les reliefs rocheux et principalement en montagne, à une altitude variant de 200 à près de 2 000 mètres. Son nid, construit en falaise ou plus rarement dans un arbre, utilisé pendant des décennies, peut devenir énorme. L'Aigle royal est le plus puissant de nos rapaces et se nourrit principalement de mammifères de taille moyenne mais aussi d'oiseaux, de reptiles et, surtout en hiver, de charognes. Sa population est de l'ordre de 390 à 450 couples.



Répartition

Eteint Menacé Préoccupation mineure
EX EW CR EN **VU** NT LC

Statut de conservation en France (UICN) : **Vulnérable**

1,25 à 1,35 m
0,5 à 0,57 m
0,5 à 1,25 kg

Adulte



AIGLE BOTTÉ

AQUILA PENNATA
FAMILLE DES ACCIPITRIDÉS

Le plus petit des aigles de France a la particularité de présenter deux plumages très différents : un clair (75 % des individus) et un sombre. Plutôt discret, sauf au moment des parades après la mi-mars, il vit en plaine et collines mais peut s'élever en moyenne montagne. L'alternance de boisements, où il niche, et de zones ouvertes, où il chasse, lui est indispensable. Ses proies sont avant tout des oiseaux de taille petite à moyenne, ensuite des reptiles et des mammifères jusqu'à la taille d'un jeune lapin. Sa reproduction est tardive et les jeunes ne s'envolent que vers la fin juillet, un mois et demi avant leur départ en migration. Sa population est estimée à 585-810 couples.

Morphe sombre



Morphe clair



Répartition

Eteint Menacé Préoccupation mineure
EX EW CR EN **VU** **NT** LC

Statut de conservation en France (UICN) : **Quasi menacé**

1,50 à 1,80 m
0,65 à 0,72 m
1,5 à 2 kg

Adulte



AIGLE DE BONELLI

AQUILA FASCIATA
FAMILLE DES ACCIPITRIDÉS

De taille intermédiaire entre l'Aigle botté et l'Aigle royal, son plumage blanc, de la gorge et du ventre, contraste avec les nuances sombres du dessous des ailes. Le plumage brun du dessus se caractérise par une tache blanche sur le dos. Pourvu d'une vue perçante, de serres puissantes et d'une grande agilité, il capture ses proies en plein vol et au sol. Les oiseaux (héron, goéland, perdrix, pigeon...) représentent 70 % de son régime alimentaire, les mammifères 25 % et les grands lézards (5 %). C'est le rapace le plus menacé de France avec 35 couples répartis dans la région méditerranéenne où il trouve les falaises pour nicher, et les plaines et les reliefs pour chasser.




Répartition

Eteint Menacé Préoccupation mineure
EX EW CR **EN** VU NT LC

Statut de conservation en France (UICN) : **En danger**

1,45 à 1,70 m
0,64 m
1 à 1,4 kg

Adulte



AIGLE POMARIN

CLANGA POMARINA
FAMILLE DES ACCIPITRIDÉS

Un seul couple isolé se reproduit dans l'est de la France depuis 2003 et à plus de 600 km de l'aire de reproduction habituelle située en Europe centrale et orientale. Ce couple fréquente une mosaïque de milieux avec des forêts où il niche et des prairies et des zones humides où il se nourrit. Son régime alimentaire se compose essentiellement de petits rongeurs et d'amphibiens. Grande migratrice, l'espèce hiverne en Afrique de l'Est et du Sud.



Répartition

Migrateur

Statut de conservation en France (UICN) :

NA (Non Applicable) : espèce non soumise à l'évaluation

LES AIGLES

AIGLE ROYAL
AIGLE BOTTÉ
AIGLE DE BONELLI
AIGLE POMARIN
CIRCAËTE
JEAN-LE-BLANC
BALBUZARD
PÊCHEUR
PYGARGUE À
QUEUE BLANCHE



AGIR pour la BIODIVERSITÉ