

Au jardin d'oiseaux :

Pendant la saison hivernale, les petits passereaux insectivores se rabattent en partie sur une nourriture d'origine végétale.

Les fruits du Pistachier lentisque sont principalement consommés par les fauvelles à tête noire, mélanocéphales et pitchous, le rougegorge et la grive musicienne. Les fauvelles à tête noire, des jardins, passerinette, grisette, mélanocéphale et pitchou ainsi que le rougequeue noir sont friands des fruits du Pistachier Térébinthe.

Les fruits du Sumac des Corroyeurs figurent au menu des fauvelles à tête noire et mélanocéphale, rougegorge, rougequeue noir, tarier pâtre et merle noir. Ajoutons que les baies rouges de la Salsepareille (*Smilax aspera*), liane épineuse vivace de l'Oléolentisque, aux feuilles alternes persistantes, cordiformes allongées, coriaces et bordées de petites épines sont prisées par la fauvelle à tête noire, le rouge-gorge, le merle noir ainsi que la grive musicienne.

Les graines ainsi consommées survivent au transit intestinal, permettant ainsi leur dissémination. Les botanistes désignent ce mode de conquête de l'espace par les plantes sous le nom d'ornithochorie.

Comment créer une "restinclière"¹ :

Plante de pleine lumière, le **Pistachier Lentisque** se révélera utile pour garnir la base d'arbustes plus grands à feuilles caduques ou pour former des massifs bas dans les jardins situés en dehors des zones d'altitude trop fraîches. Il se taille aisément et présente l'avantage d'héberger une faune d'insectes a priori très différente de la plupart des espèces fruitières inféodées aux Rosacées.

Comme de nombreuses plantes spontanées de la garrigue, les plants de lentisque sont rares dans les jardinerias. Il est donc nécessaire de rechercher les semis naturels et de prélever les jeunes plants aux premières pluies d'automne et de les élever en pépinière une ou deux saisons.

Lorsque les lentisques sont présents dans les alentours, le plus sage est de laisser nos amis ailés jouer leur rôle d'arboriculteurs.

¹ de l'Occitan *restinclièira*: lieu où pousse le pistachier lentisque



Flore méditerranéenne

Autour du Pistachier lentisque

Classification :

Avec les **Sumacs**, les **Pistachiers** sont les représentants spontanés de la famille des *Anacardiacees* qui comprennent entre autre les noix de cajou et les mangues.

Le **Sumac des Corroyeurs** (*Rhus coriaria*) ou Roudou en Occitan est un arbrisseau de 1 à 3 m. velu dans la partie supérieure, à suc laiteux. Les feuilles sont caduques avec un nombre impair de folioles ovales lancéolées et dentées, velues, rougissantes en automne. Les petites fleurs blanchâtres sont en inflorescence dense et les fruits velus de couleur brun pourpre (VI-VIII).

Le **Pistachier lentisque** est un arbuste particulièrement représentatif des milieux les plus chauds du climat méditerranéen que l'on retrouve en association avec l'Oléastre (olivier sauvage), la Salsepareille et la Myrte dans un groupement végétal nommé "l'Oléolentisque" (*l'Oléo-Lentiscetum* des phytosociologues), mais également dans les boisements clairs à Pin d'Alep ou d'autres formations de garrigues basses (Yeuse ou Chêne vert).

Le **Pistachier térébinthe** se trouve disséminé dans les formations du Chêne vert et du Chêne pubescent.






Si l'on incise le tronc de ce végétal, il s'en écoule un suc résineux nommé mastic qui, une fois distillé, fournit une essence employée en parfumerie.

Le Lentisque est souvent porteur d'une galle en forme de "banane" de couleur rosée à rougeâtre.


Le **Pistachier Térébinthe** (*Pistacia terebinthus*) ou Pudis en Occitan, est un arbrisseau de 2 à 5 m. qui se distingue du Lentisque par des feuilles caduques au nombre impair de folioles (9 à 11) luisantes, ovales elliptiques, au pétiole non ailé qui, si on les déchire ou les froisse dégagent une odeur forte d'essence de térébenthine. Les fleurs, en grappes composées, naissent sur les rameaux de l'année précédente. Les fruits de la taille d'un pois, sont rouges puis virent au brun.

Détermination des deux espèces de pistachiers

Le **Pistachier Lentisque** (*Pistacia lentiscus*) ou Restinolé en Occitan se présente sous la forme d'un **arbrisseau** à odeur de résine qui dépasse rarement les deux à trois mètres de hauteur. Les feuilles sont persistantes, composées, et possèdent un nombre pair de folioles (4 à 10) d'un vert sombre, elliptiques, obtuses, luisantes en dessus, glabres, coriaces et dont le pétiole est bordé d'une aile verte. On trouve des pieds mâles et femelles distincts (espèce dioïque) qui fleurissent en grappes denses en mai. Les pieds femelles produisent de petits fruits (2 à 3 mm) légèrement charnus, à noyau dur et portent souvent le style de la fleur à leur sommet qui fleurit au cours de l'hiver, passant d'une couleur rosée à une couleur bleutée à maturité (IV-V).



P.T. Pistachier térébinthe



P.L. Pistachier lentisque

