



Guide d'identification d'oiseaux marins de Méditerranée

à destination des pêcheurs




AGIR pour la
BIODIVERSITÉ

Puffins et océanite



Puffin yelkouan

(N) [UYE] *Puffinus yelkouan*



EN

Plumage plus contrasté que le Puffin des Baléares. Se rassemble souvent en grands groupes. Peut plonger jusqu'à 40 m de profondeur. Envergure 70 - 84 cm



Océanite tempête

(P) [DAZ] *Hydrobates pelagicus*



VU

C'est le plus petit oiseau marin d'Europe. Caractérisé par un vol erratique, des battements fréquents, toujours près de la surface de l'eau. Peut se nourrir d'huile de poisson. Envergure 37 - 41 cm




Les puffins alternent des battements d'ailes et vol plané au ras des vagues, ailes tendues.



Puffin des Baléares

(P) [UIM] *Puffinus mauretanicus*




CR

Ressemble au Puffin yelkouan mais souvent plus ventru et lourd avec une alternance de battements moins rapides et de planés. Envergure 78 - 90 cm



Puffin de Scopoli

(N) [CDI] *Calonectris diomedea*



VU


C'est le plus grand des puffins en Méditerranée. Caractérisé par de longues ailes souples toujours plus ou moins en cloche. Envergure 112 - 122 cm

Mouettes



Mouette rieuse

(N,A) [CVV] *Larus ridibundus*




Commune et familière, espèce plutôt côtière. Envergure 86 - 99cm

NT




Mouette tridactyle

(H,P) [QDV] *Rissa tridactyla*



Mouette mélanocéphale

(N,P) [NTY] *Larus melanocephalus*



blanche contrairement aux pointes noires des ailes de la Mouette rieuse

tache noire plus diffuse que la Mouette rieuse

pointe blanche

dessous de l'aile plus claire que la Mouette rieuse




adulte internuptial



Couleur du plumage plus clair, avec un bec plus court, plus épais, et des ailes moins pointues, plus larges que la Mouette rieuse. Envergure 94 - 102 cm

LC



bande noire entre la tête et le dos

bec noir



VU


La pointe des ailes paraît entièrement noire à distance, ce qui la distingue des goélands avec lesquels elle peut être confondue. Envergure 93 - 105cm

Goélands et labbe



Goéland leucophée

(N,A) [DKH] *Larus michahellis*




Surnommé «Gabian», c'est une espèce commune très opportuniste. Son vol est un battement d'ailes lent et il plane à la manière d'un rapace. Envergure 120 -140 cm

LC




Labbe parasite

(P) [TBW] *Stercorarius parasiticus*



Goéland d'Audouin

(P) [LVH] *Larus audouinii*




Un des goélands les plus rares. S'alimente surtout de poissons pêchés à partir de la surface ou en plongée peu profonde. Envergure 117 - 128 cm

EN




Goéland brun

(H,P) [LOW] *Larus fuscus*



Similaire au Goéland leucophée mais moins abondant, il est légèrement plus fin avec un plumage foncé. Envergure 117 - 134 cm

LC



Harcèle les oiseaux marins pour voler leur nourriture. Envergure 108 - 118 cm


LC

Sternes et guifettes



Sterne caugek

(N,A) [DYQ] *Thalasseus sandvicensis*



En chasse, elle pointe son bec vers le bas effectuant des plongées soudaines pour attraper des poissons.
Envergure 85 - 97 cm

NT



Guifette noire

(P) [FBS] *Chlidonias niger*




adulte nuptial



Sterne pierregarin

(N) [TVA] *Sterna hirundo*




Plane et plonge directement pour attraper les poissons. Vol plus lent et plus dynamique que la Sterne caugek.
Envergure 70 - 80 cm

LC




Sterne naine

(N) [FBP] *Sternula albifrons*



Bat rapidement des ailes, plonge de manière rapide et répétée pour attraper du poisson. C'est la plus petite des sternes. Envergure 41 - 47 cm

LC



adulte internuptial

Se nourrit généralement près de la surface avec un vol bondissant, léger, imprévisible, avec de fréquents virages.
Envergure 56 - 62 cm


EN

Cormorans



Cormoran huppé de Méditerranée

(N,A) [ISW] *Gulosus aristotelis desmarestii*





Capture diverses espèces de poissons dans les eaux côtières et peut atteindre des profondeurs de plus 50 m en poursuivant ses proies sous l'eau. Envergure 95 - 110 cm

LC



Grand Cormoran

(H,N) [ISY] *Phalacrocorax carbo*



Plus gros et massif que le Cormoran huppé, il nage avec le corps presque immergé. Envergure 121 - 149 cm


LC

Fou de Bassan et pingouins




Fou de Bassan

(H,N) [MVB] *Morus bassanus*



juvénile



jeune de 3 ans

adulte interuptual

Comparé aux puffins, le Fou de Bassan est beaucoup plus grand avec une tête et un cou plus longs ainsi que l'arrière du corps et une queue plus effilés.

tête lavée de jaune

œil bleu clair

bec en poignard marqué de lignes noires

NT

Ailes maintenues droites en vol plané, donnant l'impression d'une « croix » de loin. Effectue d'impressionnantes plongées diagonales à pic d'une hauteur de 10 à 40 m pour attraper des poissons, en repliant ses ailes juste avant de heurter la surface de l'eau. En été, la tête prend une couleur jaune plus marquée. Envergure 170 - 192 cm



Macareux moine

(H) [FPA] *Fratercula artica*



adulte nuptial

bec triangulaire terne

petit bec



juvénile

disque facial grisâtre

adulte interuptual



Pingouin torda

(H) [HBW] *Alca torda*

bec court, épais et aplati

courtes ailes

blanc

adulte nuptial

Le Macareux moine attrape ses proies en s'immergeant depuis la surface, puis en se propulsant sous l'eau à l'aide de ses ailes. Envergure 50 - 60 cm

CR

Le Pingouin torda est plus grand et possède une queue plus pointue. Envergure 60 - 69 cm


CR

Le projet LIFE PanPuffinus!



Ce guide a été préparé dans le cadre du projet LifePanPuffinus! qui vise à protéger le Puffin yelkouan et le Puffin des Baléares notamment en identifiant et partageant les bonnes pratiques des pêcheurs. À destination des pêcheurs engagés aux côtés de la LPO, il doit permettre d'identifier les oiseaux marins qu'ils peuvent rencontrer.

Menacée



Symboles sur l'état de conservation des espèces au niveau français, selon l'Union Internationale de la Conservation de la Nature (CC ProvitaRLE NC SA, 2016).

Pour aller plus loin :

Site internet :
<https://www.oiseaux.net/>
 Ouvrage de référence : Duquet 2021.
 Les oiseaux de mer et de rivage par la couleur. Ed. Delachaux & Niestlé.

Crédit illustration et licence chants et cris : Puffin yelkouan (François Desbordes (F.D), CC Audevard Aurélien NC SA 4.0), Puffin des Baléares (F.D, CC Miguel McMinn Grive NC ND 2.5), Mouette rieuse, Sterne caugek (F.D, CC Jack Berteau NC SA 4.0), Mouette mélanocéphale, (F.D, CC Peter Boesman NC ND 4.0), Mouette tridactyle, Goéland d'Audouin (F.D, CC Stanislas Wroza NC SA 4.0), Goéland leucopée adulte (F.D, CC Jorge Leitão NC SA 4.0), Goéland brun, Sterne naine, Océanite tempête (F.D, CC Irish Wildlife Sounds NC SA 4.0), Sterne Pierregarin (F.D, CC William Whitehead NC ND 4.0), Guifette noire (F.D, CC Marco Dragonetti NC ND 4.0), Puffin de Scopoli, Labbe parasite, Fou de Bassan, Macareux moine, Pingouin torda (Killian Mullarney (K.M), CC Stanislas Wroza NC SA 4.0), Goéland leucopée juvénile (K.M), Cormoran huppé de Méditerranée (K.M, CC Irish Wildlife Sounds NC SA 4.0), Grand Cormoran (BirdLife Europe/Julia Hartingerova, CC Peter Boesman NC ND 4.0)

Crédit photo 1^{ère} page : Pep Arcos – SEO/BirdLife - **Textes :** Julie Grolleau - **Maquette :** Fabien Ratelet, Service Editions LPO 2022, Rochefort, ED2204001

Comités de relecture et appui technique : Sarah Bagnis, Alexandra Caron-Strehlow, Elise Cougnenc, Sebastien Dalloyau, Julie Gomez, Thierry Micol, Killian Mullarney, Susan Waugh
 Enregistrement des chants et cris : <https://xeno-canto.org/>

Les QR codes ont été produits grâce au site : <https://fr.qr-code-generator.com/>

Nous suivons la taxonomie de BirdLife International.

Citation: LPO 2022. Guide d'identification d'oiseaux marins de Méditerranée à destination des pêcheurs, Projet LIFE PanPuffinus ! LPO, Rochefort.