

Oiseaux nicheurs de la région Occitanie

(258 espèces sur les 306 que compte la France métropolitaine)

- Accenteur alpin *Prunella collaris*
- Accenteur mouchet *Prunella modularis*
- Aigle botté *Hieraaetus pennatus*
- Aigle de Bonelli *Aquila fasciata*
- Aigle royal *Aquila chrysaetos*
- Aigrette garzette *Egretta garzetta*
- Alouette calandre *Melanocorypha calandra*
- Alouette calandrelle *Calandrella brachydactyla*
- Alouette des champs *Alauda arvensis*
- Alouette lulu *Lullula arborea*
- Autour des palombes *Astur gentilis*
- Avocette élégante *Recurvirostra avosetta*

- Bécasse des bois *Scolopax rusticola*
- Bécassine des marais *Gallinago gallinago*
- Bec-croisé des sapins *Loxia curvirostra*
- Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea*
- Bergeronnette grise *Motacilla alba*
- Bergeronnette printanière *Motacilla flava*
- Bernache du Canada *Branta canadensis*
- Bernache nonnette *Branta leucopsis*
- Bihoreau gris *Nycticorax nycticorax*
- Blongios nain *Botaurus minutus*
- Bondrée apivore *Pernis apivorus*
- Bouscarle de Cetti *Cettia cetti*
- Bouvreuil pivoine *Pyrrhula pyrrhula*
- Bruant des roseaux *Emberiza schoeniolus*
- Bruant fou *Emberiza cia*
- Bruant jaune *Emberiza citrinella*
- Bruant ortolan *Emberiza hortulana*
- Bruant proyer *Emberiza calandra*
- Bruant zizi *Emberiza cirlus*
- Busard cendré *Circus pygargus*
- Busard des roseaux *Circus aeruginosus*
- Busard Saint-Martin *Circus cyaneus*
- Buse variable *Buteo buteo*
- Butor étoilé *Botaurus stellaris*

- Caille des blés *Coturnix coturnix*
- Canard carolin *Aix sponsa*
- Canard chipeau *Mareca strepera*
- Canard colvert *Anas platyrhynchos*
- Canard mandarin *Aix galericulata*
- Canard pilet *Anas acuta*
- Canard souchet *Spatula clypeata*
- Chardonneret élégant *Carduelis carduelis*
- Chevalier gambette *Tringa totanus*
- Chevalier guignette *Actitis hypoleucos*
- Chevêche d'Athéna *Athene noctua*
- Chevêchette d'Europe *Glaucidium passerinum*
- Chocard à bec jaune *Pyrrhocorax graculus*
- Choucas des tours *Coloeus monedula*
- Chouette de Tengmalm *Aegolius funereus*
- Chouette hulotte *Strix aluco*

- Cigogne blanche *Ciconia ciconia*
- Cincla plongeur *Cinclus cinclus*
- Circaète Jean-le-Blanc *Circaetus gallicus*
- Cisticole des joncs *Cisticola juncidis*
- Cochevis de Thékla *Galerida theklae*
- Cochevis huppé *Galerida cristata*
- Corbeau freux *Corvus frugilegus*
- Corbeau freux *Corvus frugilegus*
- Cormoran huppé *Gulosus aristotelis*
- Corneille noire *Corvus corone*
- Coucou geai *Clamator glandarius*
- Coucou gris *Cuculus canorus*
- Courlis cendré *Numenius arquata*
- Crabier chevelu *Ardeola ralloides*
- Crave à bec rouge *Pyrrhocorax pyrrhocorax*
- Cygne noir *Cygnus atratus*
- Cygne tuberculé *Cygnus olor*

- Échasse blanche *Himantopus himantopus*
- Effraie des clochers *Tyto alba*
- Élanion blanc *Elanus caeruleus*
- Engoulevent d'Europe *Caprimulgus europaeus*
- Épervier d'Europe *Accipiter nisus*
- Étourneau sansonnet *Sturnus vulgaris*
- Étourneau unicolore *Sturnus unicolor*

- Faisan de Colchide *Phasianus colchicus*
- Faucon crécerelle *Falco tinnunculus*
- Faucon crécerellette *Falco naumanni*
- Faucon hobereau *Falco subbuteo*
- Faucon kobez *Falco vespertinus*
- Faucon pèlerin *Falco peregrinus*
- Fauvette à lunettes *Curruca conspicillata*
- Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla*
- Fauvette des jardins *Sylvia borin*
- Fauvette grisette *Curruca communis*
- Fauvette mélanocéphale *Curruca melanocephala*
- Fauvette orphée *Curruca hortensis*
- Fauvette passerinette *Curruca iberiae*
- Fauvette pitchou *Curruca undata*
- Flamant nain *Phoeniconaias minor*
- Flamant rose *Phoenicopterus roseus*
- Foulque macroule *Fulica atra*
- Fuligule milouin *Aythya ferina*
- Fuligule morillon *Aythya fuligula*

- Gallinule poule-d'eau *Gallinula chloropus*
- Ganga cata *Pterodroma alchata*
- Geai des chênes *Garrulus glandarius*
- Gélinotte des bois *Tetrastes bonasia*
- Glaréole à collier *Glareola pratincola*
- Gobemouche gris *Muscicapa striata*
- Gobemouche noir *Ficedula hypoleuca*
- Goéland brun *Larus fuscus*
- Goéland d'Audouin *Ichthyophaga audouinii*

- Goéland leucophaée *Larus michahellis*
- Goéland raillieur *Chroicocephalus genei*
- Grand Corbeau *Corvus corax*
- Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo*
- Grand Tétraz *Tetrao urogallus*
- Grand-duc d'Europe *Bubo bubo*
- Grande Aigrette *Ardea alba*
- Gravelot à collier interrompu *Anarhynchus alexandrinus*
- Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis*
- Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis*
- Grèbe huppé *Podiceps cristatus*
- Grimpereau des bois *Certhia familiaris*
- Grimpereau des jardins *Certhia brachydactyla*
- Grive draine *Turdus viscivorus*
- Grive litorne *Turdus pilaris*
- Grive musicienne *Turdus philomelos*
- Grosbec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*
- Guépier d'Europe *Merops apiaster*
- Guifette moustac *Chlidonias hybrida*
- Guifette noire *Chlidonias niger*
- Gypaète barbu *Gypaetus barbatus*

- Harle bièvre *Mergus merganser*
- Héron cendré *Ardea cinerea*
- Héron garde-bœufs *Ardea ibis*
- Héron pourpré *Ardea purpurea*
- Hibou des marais *Asio flammeus*
- Hibou moyen-duc *Asio otus*
- Hirondelle de fenêtre *Delichon urbicum*
- Hirondelle de rivage *Riparia riparia*
- Hirondelle de rochers *Ptyonoprogne rupestris*
- Hirondelle rustique *Hirundo rustica*
- Huïtrier pie *Haematopus ostralegus*
- Huppe fasciée *Upupa epops*
- Hypolaïs polyglotte *Hippolaïs polyglotta*

- Ibis falcinelle *Plegadis falcinellus*
- Lagopède alpin *Lagopus muta*
- Liéiothrix jaune *Liethrix lutea*
- Linotte mélodieuse *Linaria cannabina*
- Locustelle lusciniôide *Locustella luscinioides*
- Locustelle tachetée *Locustella naevia*
- Loriot d'Europe *Oriolus oriolus*
- Lusciniôle à moustaches *Acrocephalus melanopogon*

- Marouette de Baillon *Zapornia pusilla*
- Marouette ponctuée *Porzana porzana*
- Marouette poussin *Zapornia parva*
- Martin triste *Acridotheres tristis*
- Martinet à ventre blanc *Tachymaptis melba*
- Martinet noir *Apus apus*
- Martinet pâle *Apus pallidus*
- Martin-pêcheur d'Europe *Alcedo atthis*
- Merle à plastron *Turdus torquatus*
- Merle noir *Turdus merula*

- Mésange à longue queue *Aegithalos caudatus*
- Mésange bleue *Cyanistes caeruleus*
- Mésange boréale *Poecile montanus*
- Mésange charbonnière *Parus major*
- Mésange huppée *Lophophanes cristatus*
- Mésange noire *Periparus ater*
- Mésange nonnette *Poecile palustris*
- Milan noir *Milvus migrans*
- Milan royal *Milvus milvus*
- Moineau domestique *Passer domesticus*
- Moineau friquet *Passer montanus*
- Moineau soulcie *Petronia petronia*
- Monticole bleu *Monticola solitarius*
- Monticole de roche *Monticola saxatilis*
- Mouette mélanocéphale *Ichthyophaga melanocephalus*
- Mouette rieuse *Chroicocephalus ridibundus*

- Nette rousse *Netta rufina*
- Niverolle alpine *Montifringilla nivalis*
- Oedicnème criard *Burhinus oedicnemus*
- Oie cendrée *Anser anser*
- Ouette d'Égypte *Alapochen aegyptiaca*
- Outarde barbut *Otis tarda*
- Outarde canepetière *Tetrax tetrax*

- Panure à moustaches *Panurus biarmicus*
- Perdrix bartavelle *Alectoris graeca*
- Perdrix grise *Perdix perdix*
- Perdrix rouge *Alectoris rufa*
- Perruche à collier *Psittacula krameri*
- Petit Gravelot *Charadrius dubius*
- Petit-duc scops *Otus scops*
- Pic à dos blanc *Dendrocopos leucotos*
- Pic cendré *Picus canus*
- Pic de Sharpe *Picus sharpei*
- Pic épeiche *Dendrocopos major*
- Pic épeichette *Dryobates minor*
- Pic mar *Dendrocopos medius*
- Pic noir *Dryocopus martius*
- Pic vert *Picus viridis*
- Pie bavarde *Pica pica*
- Pie-grièche à poitrine rose *Lanius minor*
- Pie-grièche à tête rousse *Lanius senator*
- Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio*
- Pie-grièche grise *Lanius excubitor*
- Pie-grièche méridionale *Lanius meridionalis*
- Pigeon biset *Columba livia*
- Pigeon biset domestique *Columba livia f. domestica*
- Pigeon colombine *Columba oenas*
- Pigeon ramier *Columba palumbus*
- Pinson des arbres *Fringilla coelebs*
- Pipit des arbres *Anthus trivialis*
- Pipit farlouse *Anthus pratensis*
- Pipit rousseline *Anthus campestris*
- Pipit spioncelle *Anthus spinoletta*
- Pluvier guignard *Eudromias mariniellus*

- Pouillot de Bonelli *Phylloscopus bonelli*
- Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus*
- Pouillot ibérique *Phylloscopus ibericus*
- Pouillot siffleur *Phylloscopus sibilatrix*
- Pouillot véloce *Phylloscopus collybita*

- Râle d'eau *Rallus aquaticus*
- Râle des genêts *Crex crex*
- Rémiz penduline *Remiz pendulinus*
- Roitelet à triple bandeau *Regulus ignicapilla*
- Roitelet huppé *Regulus regulus*
- Rollier d'Europe *Coracias garrulus*
- Rossignol philomèle *Luscinia megarhynchos*
- Rougegorge familier *Erithacus rubecula*
- Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus*
- Rougequeue noir *Phoenicurus ochruros*
- Rousserolle effarvatte *Acrocephalus scirpaceus*
- Rousserolle turdoïde *Acrocephalus arundinaceus*

- Sarcelle d'été *Spatula querquedula*
- Sarcelle d'hiver *Anas crecca*
- Serin cini *Serinus serinus*
- Sittelle torchepot *Sitta europaea*
- Spatule blanche *Platalea leucorodia*
- Sterne caugek *Thalasseus sandvicensis*
- Sterne hansel *Gelochelidon nilotica*
- Sterne naine *Sternula albigularis*
- Sterne pierregarin *Sterna hirundo*

- Tadorne casarca *Tadorna ferruginea*
- Tadorne de Belon *Tadorna tadorna*
- Talève sultane *Porphyrio porphyrio*
- Tarier des prés *Saxicola rubetra*
- Tarier pâle *Saxicola rubicola*
- Tarin des aulnes *Spinus spinus*
- Tétras lyre *Lyrurus tetrix*
- Tichodrome échelette *Tichodroma muraria*
- Torcol fourmilier *Jynx torquilla*
- Tourterelle des bois *Streptopelia turtur*
- Tourterelle rieuse *Streptopelia roseogrisea*
- Tourterelle turque *Streptopelia decaocto*
- Traquet motteux *Oenanthe oenanthe*
- Traquet oreillard *Oenanthe hispanica*
- Traquet rieur *Oenanthe leucura*
- Troglodyte mignon *Troglodytes troglodytes*

- Vanneau huppé *Vanellus vanellus*
- Vautour fauve *Gyps fulvus*
- Vautour moine *Aegypius monachus*
- Vautour percnoptère *Neophron percnopterus*
- Venturon montagnard *Carduelis citrinella*
- Verdier d'Europe *Chloris chloris*

Légende :
Espèce disparue (ne se reproduisant plus dans la région)
Espèce nicheuse occasionnelle
Espèce introduite ou échappée de captivité




Fort de plus de 6 500 adhérents, de centaines de bénévoles actifs et de près de 50 salariés, la LPO Occitanie œuvre au quotidien à la protection des espèces, à la préservation des espaces, à l'éducation et la sensibilisation à l'environnement.

La LPO possède un outil d'inventaire participatif en ligne : <https://www.faune-occitanie.org>

Avec près de 16 millions de données naturalistes récoltées par plus de 10 000 observateurs, concernant 25 groupes taxonomiques, Faune-Occitanie est un projet participatif au service de la biodiversité en Occitanie.

Du débutant à l'expert, chacun peut partager ses découvertes et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune sauvage.


Et encore plus avec l'appli NaturaList qui permet de saisir en temps réel vos observations depuis votre smartphone.



Guêpier d'Europe

Merops apiaster

↔ 44-49 cm ↓ 27-29 cm



© Antoine Joris



© Patricia Hoedts

Gravelot à collier interrompu


Charadrius alexandrinus

↔ 35-45 cm ↓ 15-17 cm

Bouvreuil pivoine

Pyrhula pyrrhula

↔ 22-28 cm ↓ 14-17,5 cm



© Louis Ferries

© Jessica Joachim

Gypaète barbu

Gypaetus barbatus

↔ 250-280 cm ↓ 110-115 cm




ad.



Tadorne de Belon

Tadorna tadorna

↔ 100-120 cm ↓ 55-65 cm




© Laurence Cambon

Faucon crécerellette

Falco naumanni

↔ 63-72 cm ↓ 27-33 cm




© Yves Pimont

Flamant rose

Phoenicopterus roseus

↔ 140-170 cm ↓ 120-145 cm



© Chantal Carrère

Oiseaux nicheurs remarquables de la région Occitanie

Apprenons à mieux les reconnaître pour mieux les préserver :


Ayez le déclic, j'observe, je clique!

www.faune-occitanie.org

Circaète Jean-le-Blanc

Circaetus gallicus

↔ 162-178 cm ↓ 62-69 cm



© Sylvain Albouy

Traquet oreillard

Oenanthe hispanica

↔ 26-29 cm ↓ 13,5-15 cm



© Didier Buysse

Crave à bec rouge

Pyrhocorax pyrrhocorax

↔ 68-80 cm ↓ 37-41 cm



© Alain Faudet

Avocette élégante

Recurvirostra avosetta

↔ 67-77 cm ↓ 42-46 cm

© Alain Faudet

Tourterelle des bois

Streptopelia turtur

↔ 45-50 cm ↓ 25-28 cm



© David Cousson

Sterne naine

Sternula albifrons

↔ 47-52 cm ↓ 21-25 cm



© Luc Claes

Huppe fasciée

Upupa epus

↔ 42-48 cm ↓ 25-29 cm



© Joël Violette

Loriot d'Europe

Oriolus oriolus

↔ 44-47 cm ↓ 22-25 cm



© Bernard Laviron

Faucon pèlerin

Falco peregrinus

↔ 89-113 cm ↓ 38-45 cm




© Michel Fernandez

Bruant ortolan

Emberiza hortulana

↔ 22-28 cm ↓ 14-17,5 cm



© Georges Oliso

Talève sultane

Porphyrio porphyrio

↔ 80-95 cm ↓ 45-50 cm



© François Berthet

Milan royal

Milvus milvus

↔ 140-165 cm ↓ 61-73 cm



© Yves Geay

Martinet à ventre blanc

Tachymarptis melba

↔ 51-58 cm ↓ 20-23 cm



© Laurent Rauschmeyer

Tichodrome échelette

Tichodroma muraria

↔ 27-32 cm ↓ 16-17 cm




© Jean-Louis Carls

pie-grièche à tête rousse

Lanius senator

↔ 26-28 cm ↓ 17-19 cm



© Claude Nardin

Lagopède alpin

Lagopus muta

↔ 54-60 cm ↓ 31-35 cm




© André Labetau

Panure à moustaches

Panurus biarmicus

↔ 16-18 cm ↓ 14-16 cm



© Marc Benezet

Cinque plongeoir

Cinclus cinclus

↔ 28-30 cm ↓ 17-20 cm



© Jacques Feijoo

Monticole de roche

Monticola saxatilis

↔ 33-37 cm ↓ 17-20 cm



© Lionel Collin

Oedicnème criard

Burhinus oedicnemus

↔ 76-88 cm ↓ 38-45 cm



© Pierre Giffon



Agir pour la biodiversité